

C. Grasmuck, M. Colin, H. Corneau, O. Mancel, C. Bricard, E. Krug
Service pharmacie, CH Jacques Monod, 61104 Flers

Introduction

Les troubles de la déglutition étant fréquents chez les personnes âgées, l'écrasement des comprimés et l'ouverture des gélules font partis des pratiques quotidiennes. En 2009, une étude menée dans le service de gériatrie du CHU de Rouen a montré que 32% des patients recevaient des médicaments écrasés et 42% des médicaments ne pouvaient l'être du fait de leur forme galénique. Le centre hospitalier de Flers prenant en charge une majorité de sujets âgés, nous avons décidé d'évaluer le niveau des connaissances des IDE sur cette pratique.

Matériel et méthodes




QCM inspiré du e-learning OMEDIT Centre
« Couper, Ecraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ?
Comment administrer en toute sécurité ? »



Autoévaluation
des IDE

Mise à disposition
immédiatement de
la correction avec
explications pour
chaque question



Résultats

65 IDE de 9 services (MCO + EHPAD) ont répondu au questionnaire



97%

appliquent les bonnes pratiques :
nettoyage mortier/pilon, protection
manipulateur, écrasement juste avant
l'administration

95%

savent que les troubles de la
déglutition doivent être tracés

91%

connaissent l'existence de la liste
des médicaments broyables



43%

n'écrasent pas les comprimés
les un après les autres
(50% à l'EHPAD)

25%

ne savent pas que l'aide-soignant
ne peut pas écraser les comprimés
(38% à l'EHPAD)

29%

ne signalent pas systématiquement
au médecin les problèmes de
déglutition du patient



74%

ignorent qu'une prescription
médicale est nécessaire
pour réaliser l'écrasement
(87% à l'EHPAD)

65%

ne connaissent pas les
risques et conséquences
de cette pratique

33%

ne savent pas qu'il ne faut
pas broyer les médicaments
gastro-résistants ou à
libération prolongée
(67% à l'EHPAD)

Conclusion

Cet audit s'inscrit dans la démarche de sécurisation de la prise en charge des patients. Bien que pratiqués quotidiennement, l'écrasement des comprimés et l'ouverture des gélules présentent néanmoins des risques pour les patients et les soignants qui sont encore méconnus des professionnels de santé. Suite à cet audit, un PHARMAIDE (support d'information destiné aux IDE) a été élaboré. Il rappelle les bonnes pratiques, l'existence de la liste (issue de la SFPC) des comprimés écrasables/gélules ouvrables déjà disponible dans l'établissement ainsi que la présence sur la pancarte d'administration de la possibilité ou non d'écraser les comprimés/ouvrir les gélules.