

Quelle évolution depuis 2013 : Etat des lieux des prescriptions de correcteurs anticholinergiques associés aux antipsychotiques



N. Rioual¹, A. Leichnam¹, M. Buisson¹, E. Palierne¹
1: Service Pharmacie, EPSM JM Charcot, Caudan

Introduction

Les anticholinergiques (Ach) dits « correcteurs » sont des traitements indispensables pour palier aux effets indésirables des neuroleptiques (NL), mais leur utilisation abusive peut entraîner de nombreux effets atropiniques périphériques et centraux.

Nous souhaitons réitérer l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) réalisées auparavant en 2013 concernant l'état des prescriptions des correcteurs Ach et d'en évaluer l'impact.

Objectif


- 1- Evaluation des prescriptions des Ach associés aux NL et les comparer aux résultats obtenus lors de l'EPP de 2013.
- 2- Sensibiliser de nouveau les médecins aux risques iatrogènes afin d'améliorer la qualité et la pertinence des prescriptions d'Ach.

Matériels et Méthodes

- 1- Analyses rétrospectives des prescriptions d'Ach associés aux NL à un instant « t ».
- 2- Interrogation des prescripteurs au sujet de leurs connaissances sur les Ach à l'aide d'un questionnaire.

Résultats

Résultats de l'EPP



Résultats des questionnaires


7 médecins sur 15 ont répondu au questionnaire

Indications des Ach


6 médecins ont eu la bonne réponse

Syndrome parkinsonien lié aux neuroleptiques


Signes cliniques justifiant la prescription d'un Ach



Contre indications des Ach



Surveillance des effets indésirables des Ach




Réévaluation des traitements Ach

2 médecins sur 7 interrogés réévaluent systématiquement les traitements Ach après 1 mois de traitement Ach

Recommandation: Entre 1 à 3 mois de traitement Ach


Taux de NL de 1^{ère} et 2^{ème} générations prescrits en fonction de l'année



Taux de neuroleptiques prescrits en fonction de l'année

	1 NL	2 NL	3 NL	4 NL
2013	37 %	44 %	18 %	0 %
2017	33 %	43 %	18 %	3 %
En association à un Ach en 2017	48 %	60%	94 %	100 %

Délai de réévaluation des traitements Ach



Discussion

Cette EPP met en évidence que les prescripteurs ne réévaluent pas systématiquement les prescriptions d'Ach associés aux NL, ce constat se confirme par les résultats des questionnaires. En effet, les médecins qui réévaluent les prescriptions d'Ach ne l'effectuent qu'après arrêt ou changement du NL associé mais pas après initiation de celui-ci.

Bien que le nombre de NL prescrit est identique à 2013, les NL de 2^{ème} génération, ayant des propriétés moins cholinergiques sont aujourd'hui davantage prescrits (60%) expliquant alors la diminution des prescriptions d'Ach associés aux NL en 2017.

Ce questionnaire a également permis de confirmer les connaissances des médecins concernant les Ach.

Conclusion

Les chiffres nous montrent qu'il n'y a pas eu de modification des pratiques au sujet des prescriptions d'Ach entre 2013 et 2017. Ces résultats ont été présentés au sein de notre COMEDIMS et a permis de sensibiliser une seconde fois les prescripteurs.