

ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES ET DOCETAXEL : UN ATOUT DANS LA GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES

E. DELAVOÏPIÈRE¹, C. MAGNAN¹, ML. LE BELLEC¹, D. LEMOINE¹, P. ALLAIN², S. TRUET¹
¹Pharmacie ²Unité de cancérologie pluridisciplinaire - CH Aunay-Bayeux, 14400 BAYEUX



Introduction

Survenue d'**entérocolites** fatales chez des patientes traitées par **docetaxel** pour un **cancer du sein** non métastatique



16
Octobre
2017

Avis d'experts INCa : **prévention et gestion des effets indésirables** des taxanes

OBJECTIF : Appliquer ces recommandations par la mise en place d'un entretien pharmaceutique

Matériels et méthodes

Groupe de travail = **Pharmaciens + oncologues**

- ❑ Note d'information aux patientes
- ❑ Liste des inhibiteurs enzymatiques avec degré d'impact sur la concentration de docetaxel (site DDI-predictor)
- ❑ Courrier au médecin traitant

Entretien pharmaceutique

Pour chaque nouvelle patiente recevant du docetaxel

Conciliation des traitements médicamenteux

Information

Questions et ressenti


Résultats

Durant 3 mois : **7 entretiens** d'environ **20 min** → **4 entretiens avant**, et **3 entretiens pendant** les cures de docetaxel

Conciliation des traitements médicamenteux

30 lignes de médicaments analysées :

- **Traitement habituel** : 0 à 5 médicaments par patiente (2,7 en moyenne)
- **Automédication** : 0 à 4 médicaments/plantes par patiente (1,6 en moyenne)



Interactions concernant :

- Aprépitant** (2 patientes)
- Phytothérapie** (2 patientes)

Préconisation : suspension du médicament/de la plante



Information des patientes

6 points abordés, avec les conduites à tenir :

Gestion des effets indésirables et **Interactions**

TAXOTERE :
Note d'information à destination des patientes

Madame, vous allez recevoir du TAXOTERE pour votre cancer du sein. Nous vous donnons quelques informations sur cette chimiothérapie pour qu'elle se passe bien.

Vos globules blancs vont diminuer (comme pour la majorité des chimiothérapies) :
→ pour empêcher qu'ils ne soient trop bas, vous allez recevoir une injection de **facteur de croissance (Neulasta)** le lendemain de votre chimiothérapie.

En cas de fièvre et/ou de frissons :
→ **appelez** le service UCP, votre médecin traitant ou les urgences pour faire un **examen** et/ou une **prise de sang**.

Des diarrhées et/ou des maux de ventre peuvent apparaître, surtout entre le 3ème et le 10ème jour qui suivent votre chimiothérapie :
→ Dans ce cas, **appelez** le service UCP, votre médecin traitant ou les urgences pour faire un **examen** et/ou une **prise de sang**.

Vos médicaments habituels peuvent interférer avec TAXOTERE et augmenter le risque d'effets indésirables :
→ c'est pourquoi nous vous avons demandé votre ordonnance et une analyse est faite par notre pharmacien pour détecter les éventuelles interactions. Pensez à **signaler** les médicaments que vous prenez sans ordonnance.

Attention à l'EMEND que vous avez pu utiliser au cours de chimiothérapies précédentes : ce médicament augmente la quantité de TAXOTERE dans le sang :
→ **il ne doit donc pas être pris avec TAXOTERE.**

Le pamplemousse et son jus augmentent le risque de surdosage du TAXOTERE :
→ ils sont **déconseillés**.
Les autres agrumes n'ont pas cet effet.

Des **fourmillements** dans les pieds et les mains peuvent apparaître :
→ Pensez à les **signaler** à l'oncologue ou aux infirmières **avant** chaque nouvelle cure pour pouvoir adapter la dose de votre chimiothérapie si besoin.



Questions et ressenti des patientes

Proportion de patientes	Moment de l'entretien par rapport aux cures de docetaxel :	
	Avant	Pendant
Aspect rassurant de l'entretien	4/4	1/3
Questions spontanées concernant les traitements	2/4	1/3

➔ Intérêt de réaliser l'entretien avant les cures

Conclusion

Utilité des entretiens pharmaceutiques dans la gestion des effets indésirables du docetaxel :

- ➔ Informer et rassurer les patientes
- ➔ **Détection des interactions** potentialisant ces effets chez plus de la moitié des patientes : importance de la **phytothérapie en automédication**

Perspectives :

- ➔ Poursuite des entretiens
- ➔ Evaluation par les médecins traitants du courrier reçu
- ➔ Extension des mesures au paclitaxel, autre taxane concerné par les recommandations de l'INCa