

Utilisation de l'échelle CLEOv3 pour une cotation d'interventions pharmaceutiques en conciliation de sortie : intérêt d'une cotation pluridisciplinaire

Déniel A.¹, Pinho C.², Le Bellec ML¹, Truet S.¹, Peronne E.¹, Lemoine D.¹, Landry A.¹
¹Service de pharmacie ²Service de gériatrie, centre hospitalier Aunay-Bayeux, France

Après hospitalisation en **chirurgie**, les patients sortent le plus souvent avec :

Une **ORDONNANCE DE SORTIE** (antalgique +/- anticoagulant)

qui s'ajoute aux **ORDONNANCES HABITUELLES**

RISQUE IATROGÈNE

Divergences non intentionnelles (DIVNI)

Doublons de classe avec risque de surdosage

Mise en place d'une activité de

- **conciliation de sortie** associée à un
- **entretien pharmaceutique** du patient afin de **sécuriser** sa sortie

Donc

Objectifs

Tester l'échelle **CLEOv3** de la SFPC en **conciliation de sortie**

Estimer l'**impact clinique** potentiel des **interventions pharmaceutiques (IP)** émises

Étude **rétrospective** des **conciliations de sortie de chirurgie** avec **entretien pharmaceutique** en **2018**

Cotation des **impacts cliniques potentiels des IP** réalisées selon l'échelle **CLEOv3** :

1

Pré-cotation

Groupe de **3 pharmaciens**

2

Cotation **pharmacien**

+ **médecin généraliste** hospitalier


550 conciliations d'entrée en chirurgie en 2018

170 conciliations de sortie

120 IP émises

72 avec **au moins** une DIVNI et/ou un doublon

Impact clinique potentiel des IP après **cotation pharmaciens-médecin**





Différence cotation pharmaciens-médecin sur les 120 IP

Sur-cotation médecin		Sous-cotation médecin	
Nul → Mineur	3	Moyen → Mineur	3
Mineur → Moyen	6	Mineur → Majeur	2
Mineur → Majeur	2	Moyen → Majeur	2
Moyen → Majeur	7		

74 DIVNI

46 doublons

avec risque de surdosage



- ➔ Détection d'une **DIVNI** et/ou d'un **doublon** dans **42 %** (72/170) des conciliations de sortie.
- ➔ La **moitié** des IP a été estimée comme ayant pu éviter un dommage **moyen** ou **majeur**.

Impact clinique fort

Intérêt du pharmacien en service de chirurgie
 Conciliation sortie + entretien pharmaceutique

Utilisation échelle CLEOv3 en conciliation de sortie

- ✓ **Réduction du risque iatrogène**
- ✓ Amélioration de la **compréhension** du traitement modifié et donc de la **sécurité** et de l'**observance** du patient

- ✓ Cotation **subjective** malgré des niveaux d'impacts bien définis
- ✓ Tendance des **pharmaciens** à **sous-coter** les impacts cliniques potentiels de leurs IP
- ✓ Intérêt d'un travail **pluridisciplinaire**