

FARCY R.¹, RIGAUD A.¹, COLLET C.E.¹, DETREE J.¹, CORNEAU H.¹, KRUG E.¹, COLIN M.¹
1 Service pharmacie, Centre hospitalier de Flers

Introduction

Dans le cadre de la **certification HAS** de l'établissement et après plusieurs sensibilisations sur les MAR, une évaluation du niveau de connaissance des IDE a été réalisée. L'acquisition récente de tablettes a permis **l'utilisation d'un outil numérique**.

Matériel et méthodes

Questionnaire de 8 QCM sur le site Socrative® avec utilisation de tablettes


Autoévaluation des IDE

Mise à disposition immédiate de la correction avec explications pour chaque question

Séance de 15 min réalisée par un pharmacien : Briefing – Mise en situation - Débriefing

Résultats

70 IDE de 9 services ont répondu au questionnaire



93 %


identifient les médicaments à marge thérapeutique étroite (MTE) comme étant des MAR

96 %

savent que les MAR sont très utilisés au quotidien

95 %

identifient l'insuline, les anticoagulants et le KCl comme étant des MAR



14 %

pensent que les MAR ne sont pas plus responsables d'erreurs médicamenteuses

26 %

ne savent pas que le polyionique G5% contient du potassium

11 %

ne savent pas que les MAR entraînent un risque plus élevé de dommage aux patients



70 %

ne savent pas que la colchicine est un MAR

25 %

ne savent pas que le Méthotrexate est un MAR

29 %

ne savent pas que les insulines sont des MTE

Ces résultats ont permis d'identifier un certain nombre de points **maîtrisés** et d'autres à **améliorer**. Nous avons repris la sensibilisation en nous concentrant en premier lieu sur la colchicine : élaboration d'un **support d'informations diffusé dans les services de soins**.

LA COLCHICINE : UN MEDICAMENT A RISQUE

La colchicine est un médicament à **marge thérapeutique étroite** (médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces).

La colchicine fait donc partie des **médicaments à risque** !

PAS D'ANTIDOTE

1^{er} signe de surdosage : **DIARRHEE**

Arrêt ou diminution de la dose de colchicine !

Conclusion

Les autres points à améliorer (méthotrexate, insulines, KCl...) également feront l'objet de formations à venir. **Le format interactif et ludique** a été apprécié par les participants. **La présence du pharmacien** lors de débriefing « à chaud » a permis de répondre en direct aux questions des infirmières et de **renforcer l'acquisition des connaissances**. Ce format d'outil sera réutilisé pour d'autres thématiques.